

## ⚠️ Viktig information för säker användning

SE

**Används med försiktighet:** Nopoxivir innehåller kaliumhydroxidlösning (kalilut) och kan vara fräťande om det används felaktigt.

- **Ej för oralt bruk.**
- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvara flaskan utom räckhåll för barn även när den används.
- Nopoxivir ska inte användas till spädbarn och barn under 2 år.
- Undvik kontakt med ögonen. Tvätta händerna efter varje användning. Om Nopoxivir oavsiktligt kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och sök vård. Uppsök läkare omedelbart och visa upp denna bipacksedel.
- Var försiktig så att lösningen inte kommer i kontakt med frisk hud eller slemhinnar för att undvika irritation. Låt lösningen torka helt för att undvika att den sprids till frisk hud. **Skölj omedelbart bort lösning som hamnat på frisk hud och slemhinnar med rikliga mängder rinnande vatten under 15 minuter.**
- Om lösningen sväljs ned: Skölj munnen, drick mycket vatten. Framkalla INTE kräkning. Kontakta omedelbart läkare.
- Vid överdosering eller om lösningen används för ofta kan följderna bli en smärtsam hudinflammation. Följ därför bruksanvisningen "Så här använder du Nopoxivir".
- Låt inte lösningen komma i kontakt med kläder, textilier eller bordsdukar.
- Om Nopoxivir skulle spillas ut, sug upp vätskan noga med en absorberande pappersduk och tvätta området med rikligt med vatten.
- Om spateln skulle fastna i flaskhalsen byter du ut produkten på det apotek där du köpte den. Försök inte själv ta loss spateln från flaskhalsen (risk för fräťskador).

## ⚠️ Varoitukset ja varotoimet

FI

**Käytä varoen:** Nopoxivir sisältää kaliumhydroksidiliuosta (kalilipeää) ja saattaa vähän käytettyä olla syövityvävä.

- **Ei ole tarkoitettu käyttöön suun kautta.**
- **Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä pullo poissa lasten ulottuvilta myös käytön aikana.**
- Nopoxivir-valmistetta ei saa käyttää alle 2-vuotiaalle lapsille.
- Vältä valmisteen joutumista silmiin. Pese kädet jokaisen käyttökerran jälkeen. **Jos Nopoxivir-valmistetta joutuu silmään, huuhtele silmää välittömästi 15 minuutin ajan runsaalla vedellä ja otta yhteyttä lääkärin.** Hakeudu välittömästi lääkärin ja näytä hänelle tätä pakkausselostetta.
- Varmista, että liuos ei joudu kosketuksiin terveen ihmisen tai limakalvojen kanssa, koska se aiheuttaa ärsytystä. Anna liuokseen kuivua kunnolla, ettei se levitä terveelle iholle. **Jos liuosta joutuu iholle tai limakalville, huuhtele välittömästi 15 minuutin ajan runsaalla vedellä.**
- **Jos valmistetta joutuu nieluun: Huuhtele suu ja juo runsaasti vettä. El SAA oskettaa. Ota välittömästi yhteyttä lääkärin.**
- Jos valmistetta käytetään liian suuri annos tai liian usein, ihon voi tulla kivuliais tulehdus. Lue siksi tarkasti kohta "Miten Nopoxivir-valmistetta käytetään".
- Liuos ei saa joutua kosketuksiin vaatteiden, tekstillien tai sisustustekstiliin kanssa.
- Jos Nopoxivir-valmistetta roiskuu ympäristöön, imetytä aine talouspaperiin ja pese kohta välittömästi runsaalla vedellä.
- Jos liuoksen levitin jää kiinni pullon suuhun, vältä tuote uuteen apteekkissa / jälleenmyyjällä, joita ostit sen. Älä yritys väkisin irrottaa liuoksen levitintä pullossa (syöpymävamman riski).

## ⚠️ Vigtige oplysninger om sikker brug

DK

**Anvendes med forsigtighed:** Nopoxivir indeholder en oplosning af kaliumhydroxid (kaustisk kali), som kan være ætsende ved forkert brug.

- **Ikke til indvortes brug.**
- **Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevar flasken utilgængeligt for børn – også under brug.**
- Brug ikke Nopoxivir til spædbørn og børn under 2 år.
- Undgå al kontakt med øjnene. Vask hænderne efter brug. **Hvis du ved et uheld får Nopoxivir i øjet, skal du straks skylle øjet med rigeligt vand i 15 minutter og søge læge. Søg straks læge, og medbringe denne indlægseddelen.**
- Sørg for, at oplosningen ikke kommer i kontakt med sund hud eller slimhinder for at undgå irritation. Lad oplosningen torre helt før at undgå, at den spredes til sund hud. **Hvis du spiller oplosning på hud eller slimhinder, skal du straks skylle af med rigeligt rindende vand i 15 minutter.**
- **Hvis du kommer til at sluge oplosningen:** Skyl munnen, og drick rigeligt vand. Fremkald IKKE opkastning. Søg straks læge.
- Ved overdosing eller overdriven hyppig brug, kan der opstå smertefuld betændelse i huden. Læs derfor omhyggeligt brugsanvisningen "Sådan skal du bruge Nopoxivir".
- Sørg for, at oplosningen ikke kommer i kontakt med øjne, tekstiler og duger.
- Hvis du kommer til at spilde Nopoxivir, skal du omhyggeligt tørre væsken op med køkkenrulle og straks skylle med rigeligt vand.
- Få præparatet byttet hos det apotek/den forhandler, hvor du købte det, hvis spatlen sidder fast i flaskens åbning. Forsøg ikke at få spatlen ud af flaskens åbning (risiko for ætsning).

## ⚠️ Viktig informasjon om sikker bruk

NO

**Brukes med forsiktighet:** Nopoxivir inneholder kaliumhydroksidoppløsning (kaustisk pottaske) og kan forårsake etseskader ved feil bruk.

- **Ikke til oral bruk.**
- **Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevar flasken utilgjengelig for barn også under bruk.**
- Ikke bruk Nopoxivir til spedbarn og barn under 2 år.
- Unngå all kontakt med øynene. Vask hendene etter hver gangs bruk. **Hvis Nopoxivir ved et uhell kommer inn i øynene, må en skylle umiddelbart i 15 minutter med rikelige mengder vann og oppsøk lege. Oppsøk lege umiddelbart og vis frem pakningsvedlegget.**
- Pass på at oppløsningen ikke kommer i kontakt med frisk hud eller slimhinner for å unngå irritasjon. La oppløsningen torke godt slik at den ikke spre seg til frisk hud. **Skyll umiddelbart bort oppløsning som soles på hud og slimhinner med rikelige mengder rennende vann i 15 minutter.**
- **Ved sveising:** Skyll munnen, drick rikelig med vann. IKKE fremkall brekninger. Kontakt lege umiddelbart.
- Ved overdose eller for hyppig bruk kan det oppstå smertefull betændelse i huden. Følg derfor retningslinjene for bruk under "Hvordan du bruker Nopoxivir".
- Ikke la oppløsningen komme i kontakt med klær eller andre tekstiler.
- **Hvis Nopoxivir blir solt, må væsken tørkes forsiktig opp med et absorberende papirhåndkle. Vask området umiddelbart med rikelige mengder vann.**
- **Hvis spatlen setter seg fast i flaskehalsen, kan produktet byttes på apoteket/hos forhandleren du kjøpte det av. Ikke forsøk å få spatlen ut av flaskehalsen (risiko for etseskader).**

## Till patienter, föräldrar och vårdgivare.

SE

Läs nog igenom denna bipacksedel. Den innehåller viktig information om hur man använder denna medicintekniska produkt. Kontakta läkare eller apotekspersonal om ni har några frågor.

## Bruksanvisning

### NoPoxivir

med 5 % kaliumhydroxid

Lösning för applicering på huden för behandling av molluscum contagiosum ("mollusker").

## Innehåll

1 ml Nopoxivir innehåller 50 mg kaliumhydroxid.

Övriga innehållsstoffer: renat vatten.

En förpackning innehåller 2 ml lösning för applicering på huden. Flaskans kork är försedd med en plastspatel med vilken lösningen appliceras.

## VAD NOPOXIVIR ANVÄNDS FÖR

Nopoxivir används på huden mot molluscum contagiosum ("mollusker"), en hudåkomma orsakad av ett virus. Nopoxivir gör att cellerna som är angripna av viruset löses upp. Detta startar en försvarsreaktion i huden i det område där molluskerna finns.

Syftet med behandlingen är att skapa en smärtfri inflammation inom ett litet område. Så snart denna läks, läks även molluskerna ut.

Observera: Nopoxivir är inte lämpligt för behandling av vanliga värter (verrucae). Om du inte vet om du eller ditt barn har mollusker eller vanliga värter ska du tala med din läkare innan du använder Nopoxivir.

## INNAN DU ANVÄNDER NOPOXIVIR

Nopoxivir får **inte** användas:

- i närlheten av ögonen
- på redan inflammerade molluskutslag
- på slemhinnor (t.ex. i mun eller könsorgan), öppna sår eller hud med rövår
- för behandling av vanliga värter, äldersvärter, födelsemarken, liktornar eller andra förhårdnader
- **på spädbarn eller barn under 2 år**
- på personer som har en tendens att få kraftiga ärr (hypertrofiska ärr, keloider)
- på personer med medfödd eller förvärvad immunbristsjukdom (t.ex. HIV-infektion eller behandling med läkemedel som hämmar immunsystemet). Erfarenheterna från behandling av denna patientgrupp är otillräckliga.

## Var särskilt försiktig med Nopoxivir

- om molluskutslagen sitter på ett bröst och personen ammar. Undvik att låta barnet komma i kontakt med behandlad hud.
- hos patienter med atopisk dermatit (atopiskt eksem). Nopoxivir ska inte användas om man har ett uppblössande eksem.

Rådgör med din läkare om det finns både mollusker och eksem på samma hudområde.

## Användning av Nopoxivir med andra produkter

Det finns inga kända interaktioner med andra läkemedel. Som en försiktighetsåtgärd bör du dock inte applicera Nopoxivir på det drabbade området samtidigt med andra produkter.

## SÅ HÄR ANVÄNDER DU NOPOXIVIR

Använd alltid Nopoxivir exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Se även "Viktig information för säker användning" i början av denna bipacksedel.

## Dosering

Applicera med hjälp av spateln en liten mängd Nopoxivir två gånger dagligen **exakt** på molluskutslagen. Låt lösningen **torka**. Torkar inom några sekunder vid användning enligt bruksanvisningen.

## Hur du använder Nopoxivir på rätt sätt

### 1. Gör så här för den första användningen

- Notera på kartongen vilken dag du öppnar förpackningen och kontrollera alltid detta datum före användningen.
- Nopoxivir ska användas inom 4 veckor från öppnandet.
- Se till att ha god belysning när du använder Nopoxivir.



### 2. Ta lite Nopoxivir på spateln

- Placera alltid Nopoxivir på ett stadigt och jämnt underlag, **utom räckhåll för barn**.
- Öppna den barnsäkra förslutningen (tryck och vrid samtidigt åt vänster).
- Flaskan har en skyddande tratt med ett litet plasttrö. När spateln dras ut stryks överskottsvätska av.



### 3. Applicera Nopoxivir på molluskerna

- Badda på lite lösning på alla molluskutslag med den flata sidan av spateln och låt torka. Efter 1–3 utslag tar du ny Nopoxivir-lösning på spateln. Om ingen droppar (storlek som ett sandkorn) är synligt på mollusken, doppa då spateln igen och strykk på mollusken.
- Skruva tillbaka locket med spateln på flaskan igen när du är klar.
- Förvara alltid Nopoxivir-flaskan noga i slutenhet och utan syn- och räckhåll för barn.



### 4. Upprepa behandlingen varje dag

- Applicera Nopoxivir enligt beskrivningen i steg 2 och 3 **två gånger dagligen**, lämpligen morgon och kväll.

### 5. Sluta använda produkten

- Sluta använda produkten så snart en inflammation uppstår. Inflammationen betyder att molluskutslagen börjar läka. Tecken på inflammation är rödnad som varar i minst 12 timmar.
- Sluta använda produkten efter 14 dagar även om ingen inflammation visat sig. I detta fall ska du rådgöra med läkare eller apotekspersonal.

## 6. Vänta tills molluskerna försvunnit

- Inflammationen är ett tecken på att kroppen häller på att bekämpa molluskerna. Nu gäller det bara att vara tålmodig och vänta på att de ska försvinna. När inflammationen startat tar det vanligen mellan 1 och 4 veckor till full utläkning. Nopoxivir får inte användas på inflammerade utslag. Nopoxivir kan fortfarande appliceras på utslag som inte är inflammerade och på eventuella nytillkommande utslag.



## EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Nopoxivir tolereras väl när det används enligt anvisningarna, men liksom alla andra läkemedel kan också Nopoxivir orsaka biverkningar.

### Mycket vanliga:

Kortvarig hudirritation, i synnerhet rodnad och lätt svidande känsla på appliceringsstället. Detta uppträder direkt efter appliceringen av Nopoxivir och klingar oftast av efter några minuter. Intensiteten beror på hur känslig huden är och hur mycket lösning man har applicerat. Följ därför anvisningarna noga och använd endast små mängder Nopoxivir.

Övergående inflammation med rodnad, klåda och svullnad i området kring molluskutslagen. Detta är målet med behandlingen och leder till att utslagen försvinner. En sårskorpa kan bildas på huden under tiden läkningen pågår.

### Mindre vanliga:

Övergående svagare eller starkare pigmentering i huden (hypo- respektive hyperpigmentering).

### Sällsynta:

Ärbbildning. Risken för ärbbildning är störst om man rinner hål eller klämmer på utslagen.

### Frekvens okänd:

Smärtar, ytliga sår och fjällning av huden på appliceringsstället.

Eksem eller utslag runt mollusken eller på andra kroppsområden kan uppstå. Dessa hudreaktioner tyder på att kroppen kämpar mot viruset som orsakar mollusker. Reaktionerna tros ej vara specifikt kopplade till behandlingen med Nopoxivir, utan mer sannolikt till kroppens försvarsmekanism. Kontakta läkare om du är osäker på orsaken till en hudreaktion som uppstår under eller efter behandling.

Om du får några biverkningar som inte nämns i denna bipackesedel eller om du är orolig över något som gäller behandlingen, sluta använda Nopoxivir och tala med läkare eller apotekspersonal.

## HUR NOPOXIVIR SKA FÖRVARAS

Förvara Nopoxivir utom syn- och räckhåll för barn.

Förvara flaskan väl tillsluten.

Lösningen kan sparas i 4 veckor efter det första öppnandet. Skriv upp datum för öppnandet på kartongen.

Utgångsdatum finns tryckt på kartongen och flaskan. Använd inte produkten efter detta datum.

Denna bipackesedel ändrades senast: Augusti 2019.

### Potilaille, vanhemmille tai hoitajille.

FI

Lue tämä pakkauslouste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käytämisestä, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Jos sinulla on kysyttävä, käännä lääkärin tai apteekkienkilokunnan puoleen.

### Käyttöohje

#### NoPoxivir

sisältää 5 % kaliumhydroksidia

Liuos on tarkoitettu käytettäväksi iholle ontelosylien hoitoon.

### Mitä valmiste sisältää

1 ml Nopoxivir-valmisteita sisältää 50 mg kaliumhydroksidia.

Muut aineet: puhdistettu vesi.

1 pakkauksista sisältää 2 ml iholle levitettyä liuosta. Pullon korkissa on muovinen levitin, jolla liuosta levitetään iholle.

## MIHIN NOPOXIVIR-VALMISTETTA KÄYTETÄÄN

Nopoxivir-valmiste käytetään ulkoisesti ontelosylien (*molluscum contagiosum*) hoitoon. Ontelosyylät ovat viruksen aiheuttamia ihovauroitelia.

Nopoxivir-valmiste hajottaa virustartunnan saaneita soluja ja aiheuttaa samalla puolustusreaktion siihen ihon kohtaan, jossa on ontelosyylä.

Hoidon tavoitteena on aikaansaada kivoton tulehdusreaktio pienelle alueelle. Kun tulehdus paranee, myös ontelosyylä häviää.

Huomaa: Nopoxivir-valmiste ei sovi tavallisten sylien (*verruca vulgaris*) hoitoon. Jos et ole varma, onko sinulla tai lapsellasi ontelosyylä vai tavallisia syylejä, käy lääkäriässä ennen Nopoxivir-valmisteen käyttöä.

## MITÄ SINUN ON TIEDETÄVÄ, ENNEN KUIN KÄYTÄT NOPOXIVIR-VALMISTETTA

### Älä käytä Nopoxivir-valmistetta:

- silmiin lähellä
- jos sinulla on jo tulehtuneita ontelosyylejä
- limakalvoille (esimerkiksi suuhun tai sukuelinten alueelle), avohavuoihin tai naarmuntuneelle iholle
- tavallisten sylien, rasvasylien, syntymämerkkien, liikavarpaiden tai känsien hoitoon
- alle 2-vuotiaille lapsille
- jos tiedät taipumuksesta muodostaa arpikudosta (hypertrofia arria, keloideja)
- ihmisille, joilla on synnynäinen tai hankittu immunituus (kuten HIV-infektio tai hoito, jossa käytetään puolustusjärjestelmää heikentävää valmisteita), koska valmisteen käytöstä tässä potilaaryhmässä ei toistaiseksi ole riittävästi kokemusta.

### Ole erityisen varovainen Nopoxivir-valmisteen käytössä

- ontelosylien hoitoon imetysaikana, jos ontelosyylät sijaitsevat imetysrinnassa. Estä imeväisen ja

valmisteella hoidettujen ihokohtien kosketus.

- potilaille, joilla on atooppinen dermatiti (atooppinen ihottuma). Älä käytä Nopoxivir-valmistetta, jos iho on ärtyntä tai siinä on atooppista ihottuma.

Kysy lääkäristä neuvoa, jos samalla ihoalueella on ontelosyylä ja ihottuma.

### Nopoxivir-valmisten käyttö muiden lääkevalmisteiden kanssa

Lääkevalmisteella ei ole tunnettuja yhteisvaikutuksia muiden lääkevalmisteiden kanssa. Turvallisuussystä samaa kohtaa ei pidä hoitaa Nopoxivir-valmisteella samanaikaisesti muiden lääkevalmisteiden kanssa.

## MITEN NOPOXIVIR-VALMISTETTA KÄYTETÄÄN

Käytä Nopoxivir-valmistetta juuri siten kuin tässä pakkauslousteessa on kuvattu. Tarkista ohjeet lääkärlätilä tai aptekista, jos et ole epävarma. Katso myös pakkauslousteen alussa oleva kohta "Varoitus ja varotoimet".


### Annotus ja antotapa

Sivele kahdesti päivässä levittimellä vähän Nopoxivir-valmistetta tarkasti ontelosylien päälle ja anna liuoksen kuihua. Kuivuu muutamassa sekunnissa levittäessä näiden käyttööhjeiden mukaisesti.

### Miten Nopoxivir-valmistetta käytetään oikein


#### 1. Toimi nän ennen valmisten käyttöä

- Kirjoita kartonkipakkaukseen pakkauksen avaamispäivämäärä ja tarkista päivämäärä aina ennen kuin käytät tuotetta.
- Nopoxivir-valmistetta voi käyttää 4 viikkoa pakkauksen avaamisesta.
- Käytä Nopoxivir-valmistetta hyvin valaistussa paikassa.




#### 2. Upota levitin Nopoxivir-valmisteeseen

- Aseta Nopoxivir-valmiste pullo aina tukevalle alustalle ja pois lasten ulottuvilta.
- Avaa lapsiturvalinen korkki (paina ja kierrä samanaikaisesti vasemmalle).
- Pullossa on suojaava suppilo, jossa on pieni muoviputki. Kun levitin vedetään ulos pullosta, liika neste pyyhkiytyy pois.



#### 3. Sivele Nopoxivir-valmistetta ontelosyylän päälle

- Levitä valmistetta jokaisesta ontelosyylän päälle levittimen *tasaisella puolella* ja anna liuoksen kuihua. Kasta levitin jälleen Nopoxivir-valmisteeseen, kun olet käsitellyt 1–3 sylyä. Jos pisaraa (hiukanjäyvä kokoinen) ei näy molluskan päällä, kasta spatula uudelleen ja painele molluskuun silliä uudelleen.



#### 4. Sulje levittimen ja varustettu pullon korkki käsitteilyjen jälkeen.

- Säilytä Nopoxivir-valmiste pullo aina tiiviisti suljettuna poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.



#### 5. Käytön lopettaminen

- Lopeta valmisten käyttö heti, kun tulehdus ontelosyylässä näky, koska se on merkki ontelosyylän paranemisesta. Tulehdus tunnistaa punerruksesta, joka kestää vähintään 12 tuntia.
- Lopeta valmisten käyttö kahden viikon kuluttua myös siinä tapauksessa, että tulehdusta ei ole havaittavissa. Kysy siinä tapauksessa lääkäristä tai aptekista.

#### 6. Odota, että ontelosyylät paranevat

- Tulehdus on merkki siitä, että elimistösi taistelee ontelosyylä vastaan. Nyt on oltava käsivilliä ja odottavaa, että syylät paranevat. Paraneaminen tapahtuu 1–4 viikon kuluessa tulehdusreaktio alkamisesta. Nopoxivir-valmistetta ei saa levittää tulehduteneiden sylien päälle. Nopoxivir-valmistetta voi silittää levittää niiden sylien päälle, jotka elvät ole vielä tulehtuneet, ja uusien sylien päälle.

## MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Nopoxivir-valmiste on oikein käytettyä hyvin siedetty. Kuten kaikki lääkkeet, Nopoxivir-valmistekin voi aiheuttaa haittavaikutuksia.

### Hyvin yleiset:

Ohimenevä ihoärsytystä, erityisesti punotusta ja lievää kuumotusta hoidettulla ihoalueella. Haittavaikutukset ilmenevät väliittömästi Nopoxivir-valmisten käytön jälkeen ja menevät yleensä iho muutamassa minuutissa. Ihoärsytysten voimakkaus riippuu ihan herkkyystestä ja käytetystä liuoksen määrästä. Noudata sen vuoksi tarkasti ohjeita, jonka mukaan Nopoxivir-valmistetta levitetään vain pieni määrä.

Ohimenevä tulehdusreaktio, jota ilmenevät punoituksena, kutinana ja turvotuksena ontelosyylän kohdalla. Niiden on tarkoitus johtaa ontelosyylän paranemiseen. Parantuvaan ihoon voi muodostua rupea.

### Harvinaiset:

Ohimenevä ihopigmentin heikkeneminen tai voimistuminen (hypo- tai hyperpigmentaatio).

### Erittäin harvinaiset:

Arpien muodostuminen. Arpien muodostumisen riski on suuri silloin, jos ontelosyylä raapii tai puristaa auki.

### Esiintymistiehys tuntematon:

Kipu, pinnallinen haavauma ja hilseily hoidettulla ihoalueella.

Ekseema tai ihottuma voi ilmetä ontelosyylän ympärillä tai muualla kehossa. Nämä ihoreaktiot kertoivat, että elimistö taistelee ontelosyylillä aiheuttavaa virusta vastaan. Reaktioiden ei katsota liittyvän erityisesti Nopoxivir-hoitoon, vaan todennäköisemmin elimistön puolustusmekanismeihin. Ota yhteyttä lääkäriin, jos olet epävarma hoitona aikana tai sen jälkeen ilmenevän ihoreaktion luonteesta.

Jos havaitset haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkauslousteessa tai jos hoidon jatkaminen Nopoxivir-valmisteella huolestuttaa sinua, keskeytä hoito ja kysy neuvoa lääkärlätilä tai aptekista.

## NOPOXIVIR-VALMISTEEN SÄILYTTÄMINEN

Nopoxivir-valmistetta ei saa jättää lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä pullo tiiviisti suljettuna.

Liuos säilyy 4 viikkoa pakkauksen avaamisesta. Merkitse avaamispäivämäärä kartonkipakkaukseen.

Valmisten viimeinen käyttöpäivämäärä on merkity kartonkipakkaukseen ja pulloon. Älä käytä valmistetta viimeisen käyttöpäivämääran jälkeen.

Tämä pakkauslouste on tarkistettu viimeksi: Elokuu 2019.